

Portugués

Quofura® **IrriSedro** Irrigation System Utilizar o Quofura® IrriSedro Irrigation System possibilita realizar irrigação retal. Leia ambas as páginas antes de utilizar o sistema.
Quofura® **IrriSedro** Irrigation System.

Aplicação
O Quofura® IrriSedro Irrigation System é usado para evitar incontinência fecal e/ou constipação ou para aqueles que passam longos períodos de tempo em tratamento intestinal. O sistema deve ser usado regularmente, em geral, diariamente e a cada dois dias para proporcionar o melhor efeito.

Antes de iniciar a irrigação retal
Use apenas após avaliação, aprovação e instrução completa por um médico/ enfermeiro da saúde especializada no procedimento. É obrigatório realizar um exame digital do reto antes da primeira irrigação. Você deve ser supervisionado por um profissional de saúde experiente durante sua primeira irrigação.

Indicações para o uso de irrigação retal
Indicações para os seguintes condições e sintomas podem ser beneficiadas:

- Distúrbio intestinal neurológico, por ex.: lesão da medula espinhal, espinha bífida e intestino mielomelic.
- Constipação crônica.
- Incontinência fecal crônica.

Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.
Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.

A irrigação não deve ser usada nas seguintes circunstâncias (contra-indicações absolutas durante o uso de irrigação retal):

- Remoção pré-cirúrgica de câncer
- Doença intestinal inflamatória aguda.
- Diverticulite aguda.
- Até 3 meses após cirurgia anal ou col retal.
- Até 4 semanas após poliplectomia endoscópica.
- Colite isquêmica.

Uma vez que a lista não inclui todas as contra-indicações, os fatores individuais do paciente devem sempre ser considerados para um médico/profissional de saúde.

Observações:
A irrigação retal pode estar associada a sensações de desconforto intestinal, náuseas, tremores, fadiga, sudorese, dor de cabeça e leve sangramento do reto.

Para usar o sistema, siga as instruções:
1 Encha a bolsa de água com água de torneira morna (36–38° C) [Fig. 1]
2 Encha a bolsa de água com a quantidade de água necessária para a sua irrigação). Coloque a água na bolsa a uma temperatura de 50 cm acima do nível do colchão. O comprimento do tubo da bolsa de água até a válvula é de 50 cm.

Conecte a bolsa coletora ao caterer com a guia de inserção no caterer (Fig. 8). O caterer de ø12 mm não necessita de guia.

Conecte o tubo ao caterer (Fig. 9). Abra a válvula para encher o tubo a bomba de água (Fig.10). Feche o sistema ao retirar cuidadosamente o caterer e a bolsa coletora para evitar que a água escape.

Segure o anel da guia de inserção com a escala da bolsa coletora posuado entre as marcas de 500 e 1000 ml (Fig. 11).

Posicione o paciente deitado sobre o lado esquerdo. Insira o caterer retal cuidadosamente no reto com a guia de inserção (Fig.12).

Com o caterer no reto, remova a guia de inserção e deixe a cair na bolsa coletora.

Introduza o conector da bolsa coletora na extremidade aberta do caterer.

Após a conexão, remova a tampa da bolsa de água e abra a válvula do tubo. Permita a água fluir para a bolsa coletora até que a água esteja no nível do colchão ou mais baixa, abra a válvula completamente e bombeie a água para dentro do reto.

Após introduzida a água, remova o conector do caterer (atal 5) e a matéria fecal serão despidas na bolsa coletora.

O procedimento pode ser repetido, repetindo-se as etapas de 7 a 10.

Remova o caterer retal completamente. Retire o tubo da água do caterer. Enxágue a bolsa coletora e insira o caterer e a bolsa coletora num saco para descartar, antes de jogar fora no lixo hospitalar. Lave a bolsa de água e a bomba com sabão neutro. Nêduze as peças para secar com a tampa removida da bolsa. Lave as mãos após concluir o procedimento.

Para alcançar a continência fecal ou resolver a constipação, a irrigação deve ser usada rotineiramente de forma diária ou a cada dois dias.

Use irrigação retal apenas após discuti-la detalhadamente com um profissional de saúde relevante no caso dos seguintes indivíduos (contra-indicações absolutas):

- Gravidez, gravidez planejada ou amamentação.
- Crianças menores de 3 anos de idade, considerando o tamanho e o formato do dispositivo de fornecimento de água.

Para crianças a aprovação deve ser realizada por um médico.

Doença inflamatória intestinal (por ex.: doença de Crohn ou colite ulcerativa), Sepsis perianal ativa (fístula ou abscess) ou cirurgia retal ou colônica nos últimos 6 meses.

- Diarreia de etiologia desconhecida.
- Impactação fecal/ constipação retal.
- Doença inflamatória grave.
- Radioterapia abdominal ou pélvica.
- Doença diverticular conhecida.
- Terapia de longo prazo com esteróides da MMH-International A/S.
- Terapia anti-côncora.
- Baixo teor de sódio no sangue.
- Múltiplas condições de saúde.
- Bólus colônicos nos últimos 3 meses.
- Uso de medicamentos retard para outras doenças.
- Sinais de desidratação por irrigação.
- Insuficiência cardíaca congestiva.

O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Mais informações sobre o produto podem ser obtidas em www.mbh-international.com.

Busque cuidados médicos caso ocorra uma emergência durante o uso de irrigação retal:

- Estomago persistente ou forte dor abdominal.
- Dor persistente ou forte no abdômen ou nos costões, com ou sem febre.

Caso os seus sintomas de utilização do produto sejam revertidos, evite risco de efeitos indesejados que podem influenciar a função do produto e a saúde do paciente, cuidadosos e atentos.

Distribuidor
Atramed
Olivad
Rietwiel
Rof West, 277 - Sala 603 BOM
Reto
Joimville - SC | 89223-005
Tel: +55 45 3621 5997
joimville.com.br

Observações:
A irrigação retal pode estar associada a sensações de desconforto intestinal, náuseas, tremores, fadiga, sudorese, dor de cabeça e leve sangramento do reto.

Para usar o sistema, siga as instruções:
1 Encha a bolsa de água com água de torneira morna (36–38° C) [Fig. 1]
2 Encha a bolsa de água com a quantidade de água necessária para a sua irrigação). Coloque a água na bolsa a uma temperatura de 50 cm acima do nível do colchão. O comprimento do tubo da bolsa de água até a válvula é de 50 cm.

Conecte a bolsa coletora ao caterer com a guia de inserção no caterer (Fig. 8). O caterer de ø12 mm não necessita de guia.

Conecte o tubo ao caterer (Fig. 9). Abra a válvula para encher o tubo a bomba de água (Fig.10). Feche o sistema ao retirar cuidadosamente o caterer e a bolsa coletora para evitar que a água escape.

Segure o anel da guia de inserção com a escala da bolsa coletora posuado entre as marcas de 500 e 1000 ml (Fig. 11).

Posicione o paciente deitado sobre o lado esquerdo. Insira o caterer retal cuidadosamente no reto com a guia de inserção (Fig.12).

Com o caterer no reto, remova a guia de inserção e deixe a cair na bolsa coletora.

Introduza o conector da bolsa coletora na extremidade aberta do caterer.

Após a conexão, remova a tampa da bolsa de água e abra a válvula do tubo. Permita a água fluir para a bolsa coletora até que a água esteja no nível do colchão ou mais baixa, abra a válvula completamente e bombeie a água para dentro do reto.

Após introduzida a água, remova o conector do caterer (atal 5) e a matéria fecal serão despidas na bolsa coletora.

O procedimento pode ser repetido, repetindo-se as etapas de 7 a 10.

Remova o caterer retal completamente. Retire o tubo da água do caterer. Enxágue a bolsa coletora e insira o caterer e a bolsa coletora num saco para descartar, antes de jogar fora no lixo hospitalar. Lave a bolsa de água e a bomba com sabão neutro. Nêduze as peças para secar com a tampa removida da bolsa. Lave as mãos após concluir o procedimento.

Para alcançar a continência fecal ou resolver a constipação, a irrigação deve ser usada rotineiramente de forma diária ou a cada dois dias.

עברית

Quofura® **IrriSedro** Irrigation System Utilizar o Quofura® IrriSedro Irrigation System possibilita realizar irrigação retal. Leia ambas as páginas antes de utilizar o sistema.
Quofura® **IrriSedro** Irrigation System.

Aplicação
O Quofura® IrriSedro Irrigation System é usado para evitar incontinência fecal e/ou constipação ou para aqueles que passam longos períodos de tempo em tratamento intestinal. O sistema deve ser usado regularmente, em geral, diariamente e a cada dois dias para proporcionar o melhor efeito.

Antes de iniciar a irrigação retal
Use apenas após avaliação, aprovação e instrução completa por um médico/ enfermeiro da saúde especializada no procedimento. É obrigatório realizar um exame digital do reto antes da primeira irrigação. Você deve ser supervisionado por um profissional de saúde experiente durante sua primeira irrigação.

Indicações para o uso de irrigação retal
Indicações para os seguintes condições e sintomas podem ser beneficiadas:

- Distúrbio intestinal neurológico, por ex.: lesão da medula espinhal, espinha bífida e intestino mielomelic.
- Constipação crônica.
- Incontinência fecal crônica.

Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.
Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.

A irrigação não deve ser usada nas seguintes circunstâncias (contra-indicações absolutas durante o uso de irrigação retal):

- Remoção pré-cirúrgica de câncer
- Doença intestinal inflamatória aguda.
- Diverticulite aguda.
- Até 3 meses após cirurgia anal ou col retal.
- Até 4 semanas após poliplectomia endoscópica.
- Colite isquêmica.

Uma vez que a lista não inclui todas as contra-indicações, os fatores individuais do paciente devem sempre ser considerados para um médico/profissional de saúde.

Observações:
A irrigação retal pode estar associada a sensações de desconforto intestinal, náuseas, tremores, fadiga, sudorese, dor de cabeça e leve sangramento do reto.

Para usar o sistema, siga as instruções:
1 Encha a bolsa de água com água de torneira morna (36–38° C) [Fig. 1]
2 Encha a bolsa de água com a quantidade de água necessária para a sua irrigação). Coloque a água na bolsa a uma temperatura de 50 cm acima do nível do colchão. O comprimento do tubo da bolsa de água até a válvula é de 50 cm.

Conecte a bolsa coletora ao caterer com a guia de inserção no caterer (Fig. 8). O caterer de ø12 mm não necessita de guia.

Conecte o tubo ao caterer (Fig. 9). Abra a válvula para encher o tubo a bomba de água (Fig.10). Feche o sistema ao retirar cuidadosamente o caterer e a bolsa coletora para evitar que a água escape.

Segure o anel da guia de inserção com a escala da bolsa coletora posuado entre as marcas de 500 e 1000 ml (Fig. 11).

Posicione o paciente deitado sobre o lado esquerdo. Insira o caterer retal cuidadosamente no reto com a guia de inserção (Fig.12).

Com o caterer no reto, remova a guia de inserção e deixe a cair na bolsa coletora.

Introduza o conector da bolsa coletora na extremidade aberta do caterer.

Após a conexão, remova a tampa da bolsa de água e abra a válvula do tubo. Permita a água fluir para a bolsa coletora até que a água esteja no nível do colchão ou mais baixa, abra a válvula completamente e bombeie a água para dentro do reto.

Após introduzida a água, remova o conector do caterer (atal 5) e a matéria fecal serão despidas na bolsa coletora.

O procedimento pode ser repetido, repetindo-se as etapas de 7 a 10.

Remova o caterer retal completamente. Retire o tubo da água do caterer. Enxágue a bolsa coletora e insira o caterer e a bolsa coletora num saco para descartar, antes de jogar fora no lixo hospitalar. Lave a bolsa de água e a bomba com sabão neutro. Nêduze as peças para secar com a tampa removida da bolsa. Lave as mãos após concluir o procedimento.

Para alcançar a continência fecal ou resolver a constipação, a irrigação deve ser usada rotineiramente de forma diária ou a cada dois dias.

Ελληνικά

Quofura® **IrriSedro** Irrigation System Utilizar o Quofura® IrriSedro Irrigation System possibilita realizar irrigação retal. Leia ambas as páginas antes de utilizar o sistema.
Quofura® **IrriSedro** Irrigation System.

Aplicação
O Quofura® IrriSedro Irrigation System é usado para evitar incontinência fecal e/ou constipação ou para aqueles que passam longos períodos de tempo em tratamento intestinal. O sistema deve ser usado regularmente, em geral, diariamente e a cada dois dias para proporcionar o melhor efeito.

Antes de iniciar a irrigação retal
Use apenas após avaliação, aprovação e instrução completa por um médico/ enfermeiro da saúde especializada no procedimento. É obrigatório realizar um exame digital do reto antes da primeira irrigação. Você deve ser supervisionado por um profissional de saúde experiente durante sua primeira irrigação.

Indicações para o uso de irrigação retal
Indicações para os seguintes condições e sintomas podem ser beneficiadas:

- Distúrbio intestinal neurológico, por ex.: lesão da medula espinhal, espinha bífida e intestino mielomelic.
- Constipação crônica.
- Incontinência fecal crônica.

Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.
Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.

A irrigação não deve ser usada nas seguintes circunstâncias (contra-indicações absolutas durante o uso de irrigação retal):

- Remoção pré-cirúrgica de câncer
- Doença intestinal inflamatória aguda.
- Diverticulite aguda.
- Até 3 meses após cirurgia anal ou col retal.
- Até 4 semanas após poliplectomia endoscópica.
- Colite isquêmica.

Uma vez que a lista não inclui todas as contra-indicações, os fatores individuais do paciente devem sempre ser considerados para um médico/profissional de saúde.

Observações:
A irrigação retal pode estar associada a sensações de desconforto intestinal, náuseas, tremores, fadiga, sudorese, dor de cabeça e leve sangramento do reto.

Para usar o sistema, siga as instruções:
1 Encha a bolsa de água com água de torneira morna (36–38° C) [Fig. 1]
2 Encha a bolsa de água com a quantidade de água necessária para a sua irrigação). Coloque a água na bolsa a uma temperatura de 50 cm acima do nível do colchão. O comprimento do tubo da bolsa de água até a válvula é de 50 cm.

Conecte a bolsa coletora ao caterer com a guia de inserção no caterer (Fig. 8). O caterer de ø12 mm não necessita de guia.

Conecte o tubo ao caterer (Fig. 9). Abra a válvula para encher o tubo a bomba de água (Fig.10). Feche o sistema ao retirar cuidadosamente o caterer e a bolsa coletora para evitar que a água escape.

Segure o anel da guia de inserção com a escala da bolsa coletora posuado entre as marcas de 500 e 1000 ml (Fig. 11).

Posicione o paciente deitado sobre o lado esquerdo. Insira o caterer retal cuidadosamente no reto com a guia de inserção (Fig.12).

Com o caterer no reto, remova a guia de inserção e deixe a cair na bolsa coletora.

Introduza o conector da bolsa coletora na extremidade aberta do caterer.

Após a conexão, remova a tampa da bolsa de água e abra a válvula do tubo. Permita a água fluir para a bolsa coletora até que a água esteja no nível do colchão ou mais baixa, abra a válvula completamente e bombeie a água para dentro do reto.

Após introduzida a água, remova o conector do caterer (atal 5) e a matéria fecal serão despidas na bolsa coletora.

O procedimento pode ser repetido, repetindo-se as etapas de 7 a 10.

Remova o caterer retal completamente. Retire o tubo da água do caterer. Enxágue a bolsa coletora e insira o caterer e a bolsa coletora num saco para descartar, antes de jogar fora no lixo hospitalar. Lave a bolsa de água e a bomba com sabão neutro. Nêduze as peças para secar com a tampa removida da bolsa. Lave as mãos após concluir o procedimento.

Para alcançar a continência fecal ou resolver a constipação, a irrigação deve ser usada rotineiramente de forma diária ou a cada dois dias.

Nederlands

Quofura® **IrriSedro** Irrigation System Utilizar o Quofura® IrriSedro Irrigation System possibilita realizar irrigação retal. Leia ambas as páginas antes de utilizar o sistema.
Quofura® **IrriSedro** Irrigation System.

Aplicação
O Quofura® IrriSedro Irrigation System é usado para evitar incontinência fecal e/ou constipação ou para aqueles que passam longos períodos de tempo em tratamento intestinal. O sistema deve ser usado regularmente, em geral, diariamente e a cada dois dias para proporcionar o melhor efeito.

Antes de iniciar a irrigação retal
Use apenas após avaliação, aprovação e instrução completa por um médico/ enfermeiro da saúde especializada no procedimento. É obrigatório realizar um exame digital do reto antes da primeira irrigação. Você deve ser supervisionado por um profissional de saúde experiente durante sua primeira irrigação.

Indicações para o uso de irrigação retal
Indicações para os seguintes condições e sintomas podem ser beneficiadas:

- Distúrbio intestinal neurológico, por ex.: lesão da medula espinhal, espinha bífida e intestino mielomelic.
- Constipação crônica.
- Incontinência fecal crônica.

Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.
Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.

A irrigação não deve ser usada nas seguintes circunstâncias (contra-indicações absolutas durante o uso de irrigação retal):

- Remoção pré-cirúrgica de câncer
- Doença intestinal inflamatória aguda.
- Diverticulite aguda.
- Até 3 meses após cirurgia anal ou col retal.
- Até 4 semanas após poliplectomia endoscópica.
- Colite isquêmica.

Uma vez que a lista não inclui todas as contra-indicações, os fatores individuais do paciente devem sempre ser considerados para um médico/profissional de saúde.

Observações:
A irrigação retal pode estar associada a sensações de desconforto intestinal, náuseas, tremores, fadiga, sudorese, dor de cabeça e leve sangramento do reto.

Para usar o sistema, siga as instruções:
1 Encha a bolsa de água com água de torneira morna (36–38° C) [Fig. 1]
2 Encha a bolsa de água com a quantidade de água necessária para a sua irrigação). Coloque a água na bolsa a uma temperatura de 50 cm acima do nível do colchão. O comprimento do tubo da bolsa de água até a válvula é de 50 cm.

Conecte a bolsa coletora ao caterer com a guia de inserção no caterer (Fig. 8). O caterer de ø12 mm não necessita de guia.

Conecte o tubo ao caterer (Fig. 9). Abra a válvula para encher o tubo a bomba de água (Fig.10). Feche o sistema ao retirar cuidadosamente o caterer e a bolsa coletora para evitar que a água escape.

Segure o anel da guia de inserção com a escala da bolsa coletora posuado entre as marcas de 500 e 1000 ml (Fig. 11).

Posicione o paciente deitado sobre o lado esquerdo. Insira o caterer retal cuidadosamente no reto com a guia de inserção (Fig.12).

Com o caterer no reto, remova a guia de inserção e deixe a cair na bolsa coletora.

Introduza o conector da bolsa coletora na extremidade aberta do caterer.

Após a conexão, remova a tampa da bolsa de água e abra a válvula do tubo. Permita a água fluir para a bolsa coletora até que a água esteja no nível do colchão ou mais baixa, abra a válvula completamente e bombeie a água para dentro do reto.

Após introduzida a água, remova o conector do caterer (atal 5) e a matéria fecal serão despidas na bolsa coletora.

O procedimento pode ser repetido, repetindo-se as etapas de 7 a 10.

Remova o caterer retal completamente. Retire o tubo da água do caterer. Enxágue a bolsa coletora e insira o caterer e a bolsa coletora num saco para descartar, antes de jogar fora no lixo hospitalar. Lave a bolsa de água e a bomba com sabão neutro. Nêduze as peças para secar com a tampa removida da bolsa. Lave as mãos após concluir o procedimento.

Para alcançar a continência fecal ou resolver a constipação, a irrigação deve ser usada rotineiramente de forma diária ou a cada dois dias.

Norsk

Quofura® **IrriSedro** Irrigation System Utilizar o Quofura® IrriSedro Irrigation System possibilita realizar irrigação retal. Leia ambas as páginas antes de utilizar o sistema.
Quofura® **IrriSedro** Irrigation System.

Aplicação
O Quofura® IrriSedro Irrigation System é usado para evitar incontinência fecal e/ou constipação ou para aqueles que passam longos períodos de tempo em tratamento intestinal. O sistema deve ser usado regularmente, em geral, diariamente e a cada dois dias para proporcionar o melhor efeito.

Antes de iniciar a irrigação retal
Use apenas após avaliação, aprovação e instrução completa por um médico/ enfermeiro da saúde especializada no procedimento. É obrigatório realizar um exame digital do reto antes da primeira irrigação. Você deve ser supervisionado por um profissional de saúde experiente durante sua primeira irrigação.

Indicações para o uso de irrigação retal
Indicações para os seguintes condições e sintomas podem ser beneficiadas:

- Distúrbio intestinal neurológico, por ex.: lesão da medula espinhal, espinha bífida e intestino mielomelic.
- Constipação crônica.
- Incontinência fecal crônica.

Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.
Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.

A irrigação não deve ser usada nas seguintes circunstâncias (contra-indicações absolutas durante o uso de irrigação retal):

- Remoção pré-cirúrgica de câncer
- Doença intestinal inflamatória aguda.
- Diverticulite aguda.
- Até 3 meses após cirurgia anal ou col retal.
- Até 4 semanas após poliplectomia endoscópica.
- Colite isquêmica.

Uma vez que a lista não inclui todas as contra-indicações, os fatores individuais do paciente devem sempre ser considerados para um médico/profissional de saúde.

Observações:
A irrigação retal pode estar associada a sensações de desconforto intestinal, náuseas, tremores, fadiga, sudorese, dor de cabeça e leve sangramento do reto.

Para usar o sistema, siga as instruções:
1 Encha a bolsa de água com água de torneira morna (36–38° C) [Fig. 1]
2 Encha a bolsa de água com a quantidade de água necessária para a sua irrigação). Coloque a água na bolsa a uma temperatura de 50 cm acima do nível do colchão. O comprimento do tubo da bolsa de água até a válvula é de 50 cm.

Conecte a bolsa coletora ao caterer com a guia de inserção no caterer (Fig. 8). O caterer de ø12 mm não necessita de guia.

Conecte o tubo ao caterer (Fig. 9). Abra a válvula para encher o tubo a bomba de água (Fig.10). Feche o sistema ao retirar cuidadosamente o caterer e a bolsa coletora para evitar que a água escape.

Segure o anel da guia de inserção com a escala da bolsa coletora posuado entre as marcas de 500 e 1000 ml (Fig. 11).

Posicione o paciente deitado sobre o lado esquerdo. Insira o caterer retal cuidadosamente no reto com a guia de inserção (Fig.12).

Com o caterer no reto, remova a guia de inserção e deixe a cair na bolsa coletora.

Introduza o conector da bolsa coletora na extremidade aberta do caterer.

Após a conexão, remova a tampa da bolsa de água e abra a válvula do tubo. Permita a água fluir para a bolsa coletora até que a água esteja no nível do colchão ou mais baixa, abra a válvula completamente e bombeie a água para dentro do reto.

Após introduzida a água, remova o conector do caterer (atal 5) e a matéria fecal serão despidas na bolsa coletora.

O procedimento pode ser repetido, repetindo-se as etapas de 7 a 10.

Remova o caterer retal completamente. Retire o tubo da água do caterer. Enxágue a bolsa coletora e insira o caterer e a bolsa coletora num saco para descartar, antes de jogar fora no lixo hospitalar. Lave a bolsa de água e a bomba com sabão neutro. Nêduze as peças para secar com a tampa removida da bolsa. Lave as mãos após concluir o procedimento.

Para alcançar a continência fecal ou resolver a constipação, a irrigação deve ser usada rotineiramente de forma diária ou a cada dois dias.

Svenska

Quofura® **IrriSedro** Irrigation System Utilizar o Quofura® IrriSedro Irrigation System possibilita realizar irrigação retal. Leia ambas as páginas antes de utilizar o sistema.
Quofura® **IrriSedro** Irrigation System.

Aplicação
O Quofura® IrriSedro Irrigation System é usado para evitar incontinência fecal e/ou constipação ou para aqueles que passam longos períodos de tempo em tratamento intestinal. O sistema deve ser usado regularmente, em geral, diariamente e a cada dois dias para proporcionar o melhor efeito.

Antes de iniciar a irrigação retal
Use apenas após avaliação, aprovação e instrução completa por um médico/ enfermeiro da saúde especializada no procedimento. É obrigatório realizar um exame digital do reto antes da primeira irrigação. Você deve ser supervisionado por um profissional de saúde experiente durante sua primeira irrigação.

Indicações para o uso de irrigação retal
Indicações para os seguintes condições e sintomas podem ser beneficiadas:

- Distúrbio intestinal neurológico, por ex.: lesão da medula espinhal, espinha bífida e intestino mielomelic.
- Constipação crônica.
- Incontinência fecal crônica.

Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento.
Contra-indicações
O Quofura® IrriSedro Best System exige a presença de um cuidador para realizar o procedimento